

金克槐耳颗粒配合 FAM 方案治疗晚期胃癌 38 例

刘星野^① 周默巍^① 徐 枫^② 路育芝^②

(^①佳木斯市中心医院,佳木斯 154002; ^②佳木斯纸业集团有限公司职工医院,佳木斯 154002)

1997 年 5 月~1999 年 3 月,我院共收治 38 例晚期胃癌,现将治疗情况报告如下。

方法 38 例胃癌患者均属于 III_b、IV 期,不能手术、术后复发或转移者,随机分两组治疗。治疗组 18 例。男性 8 例,女性 10 例,年龄 35 岁~80 岁,平均 57.5 岁。对照组 20 例,男性 8 例,女性 12 例,年龄 32 岁~81 岁,平均 56.5 岁。病理分型:管状腺癌,低分化腺癌,粘液腺癌,卵戒细胞癌,治疗组与对照组分别为 4 例,8 例,2 例,4 例和 5 例,7 例,4 例,4 例。

治疗方法:治疗组:金克槐耳颗粒冲剂,口服,一日 3 次,每次 20g/包。4 周为 1 个疗程。FAM 方案化疗,5-Fu500mg/m² 第 1 天到第 5 天静滴,ADM 30mg/m² 第 1 天,第 5 天静脉冲入,MTX400mg/m² 第 1 天静脉冲入,每 4 周重复。共 3 次。对照组:FAM 方案化疗方法同治疗组。两组治疗前给胃复安 20mg 静滴,预防消化道反应。血、尿常规、生化、心肝肾功能均属正常范围。

按 WHO 疗效及毒性反应分度标准评价近期疗效及不良反应。

结果 疗效评定:用药 12 周后观察近期疗效。治疗组有效率(CR + PR)55.6% (10/18),对照组 45.0% (9/20),两组无显著差异($P > 0.05$)。

不良反应:两组均未出现急性不良反应,亦无 III 度以上毒性。经对症处理后在 2~3 周内恢复正常。

6 个月生存率:治疗组为 61.11% (12/18),对照组为 45% (9/20),两组差异有显著意义($P < 0.05$)。

结论 金克槐耳颗粒有直接的抑癌作用,显著的免疫增强调节作用。金克能非常明显地诱生 α 、 γ 干扰素,能刺激产生白细胞介素 2 等淋巴因子,增强 T 细胞、NK 细胞、粒细胞、单核细胞的细胞毒活性的产生;且 α 干扰素与 γ 干扰素及白介素及其它的活性淋巴细胞之间具有协同作用,达到了联合增强的效果。本组 FAM 方案治疗晚期胃癌近期有效率 45%,口服金克槐耳颗粒配合 FAM 方案化疗,可提高 FAM 方案的疗效,明显延长晚期胃癌患者的生存时间。

(收稿:1999-05-17)