反应。

1.3 判定标准

心功能改善情况判定标准：显效为主要症状消失，且发作的次数有很大减少，几乎不发作；有效为症状有所缓解，发作次数有所减少；无效为症状没有明显改善，甚至有恶化倾向，发作次数几乎没有减少。总有效率 = 显效率 + 有效率。

心电图疗效判断标准：心电图恢复正常或是正常范围为显效；有所减轻，但没有到达正常水平为有效；心电图没有明显改变，甚至更加严重，无好转。

1.4 统计学方法

应用 SPSS l5.0 统计学软件对数据进行处理，计数资料采用 χ^2 检验，以 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

从心电图改善情况来看，治疗组 39 例患者中，有 20 例患者为显效，显效率为 52.28%（20/39），15 例患者为有效，有效率为 38.46%（15/39），总有效率为 90.74%（35/39）。对照组 39 例患者中，有 16 例患者为显效，显效率为 41.03%（16/39），有 12 例患者为有效，有效率为 30.77%（12/39），总有效率为 71.8%（28/39）。

从心功能改善情况来看，治疗组 39 例患者中 12 例为显效，显效率为 30.71%（12/39），8 例为有效，有效率为 20.51%（8/39），总有效率为 51.22%（20/39）。对照组患者中 6 例患者为显效，显效率为 15.38%（6/39），4 例患者为有效，有效率为 10.26%（4/39），总有效率为 25.64%（10/39）。

3 讨论

随着社会经济的发展，人们生活和工作节奏的加快，使生活习惯也发生了改变，饮食不健康，运动量少，睡眠时间过晚等因素都对人们的身体健康带来了极大影响，这也使冠心病患者越来越年轻化。冠心病作为一种常见内科疾病，是由于冠状动脉粥样硬化使管腔狭窄或闭塞所引起的心肌缺血缺氧性疾病[5]。其治疗多采用丹参注射液治疗，丹参具有肝素抗凝抗栓的作用，能够提高冠脉血流量，从而达到降低心肌氧耗量，来促使受损的血管内皮细胞不断修复，防止患者血管内皮细胞损伤，进而对冠心病心肌缺血的临床症状改善起到促进作用[6]。而丹红注射液是中药丹参和红花依据科学配方进行提取的复方制剂，其中红花能够起到活血通络、祛瘀止痛的作用[7-8]，故而丹红注射液对心肌缺血患者的症状有很大的缓解。

本文通过对我院收治的心肌缺血患者进行分组后治疗，对在对症治疗基础上予以的丹参注射液治疗和丹红注射液治疗进行了分析比较。从结果中不难看出丹红注射液治疗不论是在心电图改善状况，抑或是心功能改善情况都较丹参注射液能够获得更佳疗效，综上所述，丹红注射液在心肌缺血的治疗上能够获得较好的疗效。

参考文献

[1] 杨恩泰．瓜蒌薤白桂枝汤加味治疗心肌缺血临床观察 [J]. 心血管病防治知识，2014（5）：49-51.

[2] 纪伟宁．心肌缺血－再灌注损伤治疗新进展 [J]. 心血管病学进展，2011，32（3）：432-435.

[3] 黄敏瑜，陈润荣，陈少英．丹红注射液联用果糖注射液治疗心肌缺血的疗效分析 [J]. 中国医药指南，2012，10（10）：645-646.

[4] 郑志奇．丹红注射液对冠心病心绞痛及心肌缺血的疗效观察 [J]. 实用心脑肺血管病杂志，2011，19（9）：1563-1565.

[5] 陈志军，王元辉．丹红注射液与香丹注射液治疗心肌缺血的疗效观察 [J]. 实用心脑肺血管病杂志，2010，18（4）：448-449.

[6] 曾宪平．丹参注射液防治冠心病心肌缺血的疗效观察及其机制研究 [J]. 中医药导报，2010，16（8）：32-34.

[7] 赵红日，雷军．丹红治疗心肌缺血 52 例观察 [J]. 内蒙古中医药，2012，31（2）：106.

[8] 李永平．复方丹参滴丸治疗冠心病心绞痛患者的临床疗效分析 [J]. 中国继续医学教育，2014，6（8）：174-175.

槐耳颗粒治疗各种恶性肿瘤研究

瞿红英

【摘要】**目的** 观察槐耳颗粒治疗各种恶性肿瘤的临床效果。**方法** 选取我院 2014 年 8 月～2015 年 8 月收治的各种恶性肿瘤患者 74 例，随机分为两组，对照组行常规治疗，实验组则在常规治疗上加用槐耳颗粒，对比疗效。**结果** 治疗后，实验组缓解率 81.08% 高于对照组缓解率 62.16%，比较差异具有统计学意义（$P < 0.05$）。**结论** 采用槐耳颗粒治疗各种恶性肿瘤的临床效果确切。

【关键词】槐耳颗粒；恶性肿瘤
【中图分类号】R730.5　　【文献标识码】A
【文章编号】1674-9308（2015）32-0186-02
doi：10.3969/j.issn.1674-9308.2015.32.138

Clinical Research Huaier Granules in Treating Various Malignant Tumors

QU Hongying, Medical oncology, The first affiliated hospital of Baotou medical college, Baotou 014010, China

作者单位：014010 包头医学院第一附属医院肿瘤内科

[Abstract] Objective To explore the effect of huaier granules in treating all kinds of malignant tumors. **Methods** 74 cases of patients with malignant tumors were chosen from August 2014 to August 2015 in our hospital, and randomly divided into two groups. Control group received routine treatment, experimental group on the basis of conventional therapy plus huaier granules, compared effects. **Results** After treatment, the remission rate of the experimental group was 81.08% higher than that of the control group, the remission rate was 62.16%. There are statistically significant (P<0.05). **Conclusion** The effect of huaier granules in the treatment of various malignant tumor is remarkable.

[Key words] Huaier granules, Malignant tumors

近年来，随着我国社会经济的发展，人们的生活习惯、饮食规律逐渐转变，环境污染的日益严峻，使得胃癌、乳腺癌、肺癌

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

等恶性肿瘤的发病率逐年上升。临床上对于各种恶性肿瘤的治疗多以化疗、放疗等治疗为主，但放化疗治疗后的毒副作用较大，极易影响到患者的生活及生存的质量[1]。因此，选择一种切实可行的治疗方法，提升治疗疗效、改善预后尤为关键。本文主要研究槐耳颗粒治疗各种恶性肿瘤的临床效果，并作如下报道。

1 资料与方法

1.1 临床资料

选取 2014 年 8 月 ~ 2015 年 8 月我院接收并治疗的各种病理已确诊的恶性肿瘤患者 74 例，根据不同治疗方法分为实验组和对照组，每组 37 例。对照组男性 21 例，女性 16 例；年龄 37 ~ 69 岁，平均年龄（43 ± 3.29）岁；其中：胃癌 13 例、食管癌 9 例、肝癌 10 例、乳腺癌 5 例；对照组行常规治疗。实验组男性 20 例，女性 17 例；年龄 36 ~ 68 岁，平均年龄（42 ± 2.74）岁；其中：胃癌 12 例、食管癌 9 例、肝癌 9 例、乳腺癌 7 例；实验组在常规治疗基础上加用槐耳颗粒。两组患者在临床资料的比较上差异无统计学意义（$P > 0.05$），可进行对比分析。

1.2 治疗方法

两组患者入院后均行常规检查，每位患者按照其疾病制定相应的治疗方案，对照组根据癌症类型行相应的化疗等治疗，如：乳腺癌保乳切除或全乳切除、肝癌行介入等治疗；实验组则在对照组相应治疗的基础上联合槐耳颗粒，一次 20 g，3 次 /d，治疗 1 个月为 1 疗程，连续治疗 6 个疗程。

1.3 疗效标准

根据治疗后病灶改善情况、维持时间等对两组临床治疗疗效进行评定，其中：治疗后，肿瘤病灶基本消失，且持续时间在 4 周以上为完全缓解；治疗后，肿瘤病灶两径的乘积缩小程度超过 50%，无新病灶出现，且持续时间在 4 周以上为部分缓解；治疗后，肿瘤病灶两径的乘积缩小程度低于 50%，无新病灶出现，且持续时间在 4 周以上为无变化为病变稳定；治疗后，肿瘤病灶两径的乘积缩小程度超过 25%，但有新病灶出现为病变进展；缓解率 = 完全缓解率 + 部分缓解率[2]。

1.4 数据统计分析

本次研究数据均使用 SPSS 18.0 统计软件处理，计数资料的表示方式为 [例数 / 百分比，（n/%）]，当 $P < 0.05$ 时，表示比较差异存在统计学意义。

2 结果

两组临床治疗疗效中，实验组完全缓解 17 例（45.95%）、部分缓解 13 例（35.14%）、病变稳定 4 例（10.81%）、病变进展 3 例（8.11%）；缓解率为 81.08%；对照组完全缓解 11 例（29.73%）、部分缓解 12 例（32.43%）、病变稳定 8 例（21.62%）、病变进展 6 例（16.22%）；缓解率为 62.16%；组间缓解率比较差异存在统计学意义（$P < 0.05$）。

3 讨论

近年来，各种恶性肿瘤的患病率呈现出明显上升的趋势，给患者的身心健康以及生命安全造成严重的影响[3]。因此，如何强化恶性肿瘤治疗的疗效成为临床研究的重点和难点。采用放化疗、手术、保守等治疗方法治疗恶性肿瘤均有一定效果，但随着放化疗时间越长，患者机体对药物的敏感性也会随之下降；而手术本身的应激性也会给患者的机体造成伤害[3]。槐耳颗粒富含多种矿物质和氨基酸，将其应用到恶性肿瘤的治疗中，能够抑制癌细胞生长，加速癌细胞的凋亡；除此之外，槐耳颗粒能够激活中性粒细胞、巨噬细胞的活性，进而提升机体的免疫力[4]。本次研究中，加用槐耳颗粒治疗的实验组，其治疗后的缓解率明显高于对照组缓解率（$P < 0.05$）；与吴晖[5]等临床研究结果接近。综上所述，在各种恶性肿瘤治疗过程中联合槐耳颗粒，能够进一步提高治疗的疗效，提升患者生存的质量。

参考文献

[1] 刘聪，孙秀华．槐耳颗粒对 30 例晚期胃癌患者 T 细胞亚群的影响 [J]. 医学综述，2013，19（7）：1292-1293.

[2] 孙学征，赵振华，黄志坤，等．槐耳颗粒联合 TACE 对中晚期肝癌患者 T 淋巴细胞亚群的影响 [J]. 中国中医药科技，2013，20（1）：66.

[3] 沈泽天，武新虎，李兵，等．槐耳颗粒联合同步放化疗治疗局部晚期直肠癌的临床研究 [J]. 现代肿瘤医学，2014，22（5）：1114-1117.

[4] 刘艳辉．金克槐耳颗粒在乳腺癌伴高血压治疗中的作用 [J]. 中西医结合心血管病电子杂志，2015，3（8）：116-117.

[5] 吴晖．槐耳颗粒联合化疗栓塞术治疗原发性肝癌 96 例 [J]. 中国药业，2014，23（3）：16-18.

探讨自拟桂枝厚朴汤用于胆道手术后消化不良治疗中的临床效果

周浩

【摘要】**目的** 探讨自拟桂枝厚朴汤用于胆道手术后消化不良治疗中的效果。**方法** 选取 2010 年 10 月 ~ 2015 年 10 月行胆道手术后并发消化不良患者 62 例，分为两组，对照组行常规西医治疗，实验组用自拟桂枝厚朴汤治疗，分析两组治疗效果。**结果** 实验组总有效率、平均住院天数与对照组比较差异有统计学意义（$P < 0.05$）。**结论** 自拟桂枝厚朴汤用于胆道手术后消化不良治疗中的临床效果较好。

【关键词】自拟桂枝厚朴汤；胆道手术；消化不良
【中图分类号】R259 【文献标识码】A
【文章编号】1674-9308（2015）32-0187-02
doi：10.3969/j.issn.1674-9308.2015.32.139

作者单位：223600 江苏省沭阳县中医院外科一病区

To Explore the Cassia Twig Fill Thick Soup for the Treatment of Indigestion After Biliary Tract Surgery Clinical Effect

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net